



Station .....

## Hygienische Händedesinfektion nach dem WHO-Modell: „Die 5 Indikationen der Händedesinfektion“

Dieser Fragebogen legt den Schwerpunkt ausschließlich auf die Indikation „Vor aseptischer Tätigkeit“. Bitte kreuzen Sie in den nach folgenden Fragen nur die Situationen an, welche Ihrer Meinung nach der Indikation „Vor aseptischer Tätigkeit“ entsprechen.

### 1. Prävention Sepsis :

- a. Bevor ich Handschuhe anziehe und über den ZVK ein Medikament zuspritze
- b. Bevor ich über dem ZVK ein Medikament zuspritze
- c. Bevor ich die Perfusorspritze aufziehe
- d. Nachdem ich einen Verbandwechsel am ZVK durchgeführt habe
  - a.  a, b, d sind richtig, mit der Indikation: Vor aseptischer Tätigkeit
  - b.  b, c, d sind richtig, mit der Indikation: Vor aseptischer Tätigkeit
  - c.  a, b, c sind richtig, mit der Indikation: Vor aseptischer Tätigkeit

### 2. Prävention Sepsis:

- a. Bevor ich die Tropfgeschwindigkeit am Infusionssystem ändere
- b. Bevor ich das Infusionssystem an die Venenverweilkanüle anschlieÙe
- c. Bevor ich die Konnektionsstelle des ZVK's diskonnektiert und desinfiziert habe um das Medikament zuzuspritzen
- d. Nachdem ich die Infusionsflasche angehängen habe und bevor ich das Infusionssystem anschlieÙe
  - a.  a, b, c, d sind richtig, mit der Indikation: Vor aseptischer Tätigkeit
  - b.  b, c, d sind richtig, mit der Indikation: Vor aseptischer Tätigkeit
  - c.  a, b, c sind richtig, mit der Indikation: Vor aseptischer Tätigkeit

### 3. Prävention Sepsis

- a. Unmittelbar bevor ich das Medikament aufziehe
- b. Unmittelbar bevor ich das Medikament i.v. verabreiche.
- c. Nachdem ich das Medikament über den ZVK zugespritzt habe.
- d. Nachdem ich den blutigen Verband der Venenverweilkanüle entfernt habe, unmittelbar bevor ich den neuen Verband anlege.
  - a.  a, b, c, d sind richtig, mit der Indikation: Vor aseptischer Tätigkeit
  - b.  a, b, d sind richtig, mit der Indikation: Vor aseptischer Tätigkeit
  - c.  b, c, d sind richtig, mit der Indikation: Vor aseptischer Tätigkeit

#### 4. Prävention Harnwegsinfekt

- a. Bevor ich mir keimarme Handschuhe anlege um den Genitalbereich zu desinfizieren
- b. Nachdem ich mir die keimarmen Handschuhe ausgezogen habe
- c. Bevor ich sterile Handschuhe anziehe und den Harnwegkatheter aus der Hülle nehme
- d. Nach dem Ausziehen der sterilen Handschuhe
  - a.  a, b, c, d sind richtig, mit der Indikation: Vor aseptischer Tätigkeit
  - b.  a, c sind richtig, mit der Indikation: Vor aseptischer Tätigkeit
  - c.  c ist richtig, mit der Indikation: Vor aseptischer Tätigkeit

#### 5. Prävention der Atemwegsinfektionen

- a. Bevor ich den Absaugkatheter aus der Hülle entnehme
- b. Bevor ich Handschuhe anziehe und den Absaugkatheter aus der Hülle entnehme
- c. Nachdem ich den Katheter mit meinem Handschuh entsorgt habe und bevor ich einen neuen Katheter aus der Hülle nehme um erneut abzusaugen
- d. Nachdem ich den Beatmungsschlauch angefasst habe, ohne zu diskonnektieren / konnektieren
  - a.  a, b, c, d sind richtig, mit der Indikation: Vor aseptischer Tätigkeit
  - b.  a, b, c sind richtig, mit der Indikation: Vor aseptischer Tätigkeit
  - c.  b, c, d sind richtig, mit der Indikation: Vor aseptischer Tätigkeit

#### 6. Prävention Atemwegsinfektionen

- a. Bevor ich das Beatmungssystem diskonnektiere
- b. Bevor ich das Beatmungssystem konnektiere
- c. Bevor ich die Trachealkanüle wechsele
- d. Vor einer Bronchoskopie
  - a.  a, b, c, d sind richtig, mit der Indikation: Vor aseptischer Tätigkeit
  - b.  a, b, d sind richtig, mit der Indikation: Vor aseptischer Tätigkeit
  - c.  a, b, c sind richtig, mit der Indikation: Vor aseptischer Tätigkeit

#### 7. Prävention Wundinfektion

- a. Bevor ich den blutigen Wundverband abnehme
- b. Nachdem ich den blutigen Verband entfernt habe und bevor ich das neue sterile Verbandsmaterial aufbringe
- c. Bevor ich das sterile Verbandsmaterial öffne
- d. Bevor ich das Verbandsmaterial aus dem Verbandswagen entnehme
  - a.  a, b, c, d sind richtig, mit der Indikation: Vor aseptischer Tätigkeit
  - b.  a, b, d sind richtig, mit der Indikation: Vor aseptischer Tätigkeit
  - c.  b, c sind richtig, mit der Indikation: Vor aseptischer Tätigkeit

## Weitergehende Fragen (mehrere Antworten sind möglich)

8. Was hindert mich daran eine Händedesinfektion vor aseptischen Tätigkeiten durchzuführen:

- a.  Ich erkenne die Indikation nicht
- b.  Ich trage meist Handschuhe und desinfiziere mir deshalb vorher nicht die Hände
- c.  Ich trage meist Handschuhe und wechsele diese nicht direkt vor aseptischen Tätigkeiten
- d.  Wenn ich vor dem Anziehen der Handschuhe eine Händedesinfektion durchführe, habe ich noch feuchte Hände und komme nicht in die Handschuhe hinein
- e.  Andere.....

9. Welche Unterstützung brauchen Sie damit Sie vor aseptischen Tätigkeiten eine Händedesinfektion durchführen

- a.  Fortbildung zu Indikationen zur Händedesinfektion vor aseptischen Tätigkeiten
- b.  Unterstützung und Vorbild der Leitung (Pflege/ Ärzte)
- c.  Hospitation durch die Hygiene, wo ich auf Fehler hingewiesen werde
- d.  Bildliche Darstellung (Poster)
- e.  Andere.....

10. Die „AKTION Saubere Hände“ ist eine Kampagne die sich deutschlandweit zur Verbesserung der Händehygiene und zur Reduktion von nosokomialen Infektionen einsetzt.

- a.  Diese Aktion findet auch an meinem Hause statt
- b.  Ich mache eine Händedesinfektion, um mich und meine Familie zu schützen
- c.  Mir ist bewusst, dass ich durch eine gezielte Händedesinfektion Übertragungen vermeiden kann
- d.  Mir ist bewusst, dass ich durch die Händedesinfektion nosokomiale Infektionen verhindern kann

Ziel des Fragebogens ist:

- Indirektes Schulen durch die Auseinandersetzung mit den Fragen
- Das Erkennen von aseptischen Tätigkeiten
- Defizite erkennen
- Intervention

Richtige Antworten:

Frage 1: c

Frage 2: b

Frage 3: b

Frage 4: c

Frage 5: b

Frage 6: a

Frage 7: c