



Fragebogen zur hygienischen Händedesinfektion:

1. Welches ist der wichtigste Übertragungsweg von potenziell pathogenen Erregern von Patient zu Patient? Nur eine Antwort ist richtig.

- X Die kontaminierten Hände des medizinischen Personals
- Raumluftechnische Anlage in der Klinik
- Kontakt des Patienten mit kolonisierten Oberflächen (Bett, Tisch, Stuhl, Türklinke)
- Die Benutzung von z. B. Stethoskop, Blutdruckmanschette an mehreren Patienten

2. Was ist die häufigste Quelle für potentiell pathogene Erreger, welche nosokomiale Infektionen verursachen können? Nur eine Antwort ist richtig.

- Erreger im Wassersystem des Krankenhauses
- Erreger in der Luft des Krankenhauses
- X Der Patient mit seinen Erregern
- Erreger auf den Oberflächen der Krankenhausumgebung

3. Wie lange dauert eine Händedesinfektion? Nur eine Antwort ist richtig.

- X 30 Sekunden
- 3 Sekunden
- 1 Minute
- 10 Sekunden

4. Welche Aussagen zur Technik der Händedesinfektion sind richtig?

- a. Das Händedesinfektionsmittel muss die gesamte Oberfläche beider Hände benetzen X richtig falsch
- b. Die Hände müssen trocken sein, bevor man mit der Einreibung anfängt X richtig falsch
- c. Nach der Händedesinfektion kann man die Hände mit einem Tuch abtrocknen richtig X falsch

5. Welche der folgenden Punkte sollten vermieden werden, da sie die Kolonisation der Hände fördern können?

- a. Das Tragen von Schmuck an den Händen X richtig falsch
- b. Nicht intakte Haut X richtig falsch
- c. Künstliche Fingernägel X richtig falsch
- d. Regelmäßiger Gebrauch von Handcreme richtig X falsch

6. Welche der folgenden Aussagen sind richtig?

- a. Eine Händedesinfektion dauert kürzer als das Händewaschen
 richtig falsch
- b. Eine Händedesinfektion trocknet die Haut mehr aus als das Händewaschen
 richtig falsch
- c. Eine Händedesinfektion ist effektiver gegen Erreger als das Händewaschen
 richtig falsch

7. Welche der folgenden Indikationen vermeiden eine Übertragung von Erregern zum Patienten?

- a. Eine Händedesinfektion vor Patientenkontakt
 richtig falsch
- b. Eine Händedesinfektion nach Patientenkontakt
 richtig falsch
- c. Eine Händedesinfektion unmittelbar nach möglichem Kontakt mit Blut oder anderen infektiösen Materialien
 richtig falsch
- d. Eine Händedesinfektion nach unmittelbarem Kontakt mit der Patientenumgebung
 richtig falsch

8. Welche der folgenden Indikationen vermeiden eine Infektion durch Patienteneigene Erreger?

- a. Eine Händedesinfektion vor Patientenkontakt
 richtig falsch
- b. Eine Händedesinfektion nach Patientenkontakt
 richtig falsch
- c. Eine Händedesinfektion unmittelbar nach möglichem Kontakt mit Blut oder anderen infektiösen Materialien
 richtig falsch
- d. Eine Händedesinfektion unmittelbar vor einer aseptischen Tätigkeit
 richtig falsch

9. Welche der folgenden Indikationen vermeiden eine Infektion des medizinischen Personals?

- a. Eine Händedesinfektion nach Patientenkontakt
 richtig falsch
- b. Eine Händedesinfektion unmittelbar nach möglichem Kontakt mit Blut oder anderen infektiösen Materialien
 richtig falsch
- c. Eine Händedesinfektion unmittelbar vor einer aseptischen Tätigkeit
 richtig falsch
- d. Eine Händedesinfektion nach unmittelbarem Kontakt mit der Patientenumgebung
 richtig falsch

10. Kann der Kontakt mit folgenden Oberflächen zur Übertragung von potentiell pathogenen Erregern führen, wenn Sie anschließend vor Patientenkontakt eine Händedesinfektion durchführen?

- a. Türgriff des Patientenzimmers
 richtig falsch
- b. Die intakte Haut eines anderen Patienten
 richtig falsch
- c. Das Telefon
 richtig falsch

„AKTION Saubere Hände“