



# Händedesinfektion

## vor aseptischen Tätigkeiten



**VOR** dem Legen jeder Art von Kathetern (z. B. HWK, ZVK, PVK) durch die durchführende und assistierende Person

**VOR** jeder Konnektion / Diskonnektion eines invasiven Devices (z. B. jeder Art von Kathetern, Drainage- und Infusionssystemen)



**VOR** der Zubereitung von parenteral, intramuskulär oder subcutan zu verabreichenden Medikamenten und Infusionslösungen

**VOR** der Durchführung von Injektionen

**VOR** der Intubation

**VOR** jeder Konnektion / Diskonnektion des Beatmungssystems (z. B. vor dem Wechsel von Bestandteilen des Systems, inkl. Inhalationszubehör etc.)



**VOR** dem Absaugen

**VOR** jedem Kontakt mit nicht intakter Haut und Schleimhaut

**VOR** jedem Kontakt mit Wunden

**ZWISCHEN** dem Entfernen des alten Verbandes und dem Anlegen des neuen, sterilen Verbandes

**Die Händedesinfektion erfolgt unabhängig davon, ob Handschuhe getragen werden.**



Alle verwendeten Fotos © ASH 2008 -2013

Alle Informationen zur *AKTION Saubere Hände* unter: [www.aktion-sauberehaende.de](http://www.aktion-sauberehaende.de)

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses  
des Deutschen Bundestages