



Datenerfassungsbogen für die Ambulante Medizin

Dieser Bogen dient zur Erhebung der Ausstattung mit Händedesinfektionsmittelspendern und der Dokumentation Ihrer Händedesinfektionsmittel-Verbrauchsdaten.

[Bitte archivieren Sie diesen Datenerfassungsbogen, um die Werte im nächsten Jahr mit Referenzzahlen vergleichen zu können](#)

- Bestimmen Sie den IST-Wert und SOLL-Wert der einzelnen Behandlungsräume Ihrer Einrichtung und tragen Sie diesen in die untere Tabelle ein.
→ Eine Hilfestellung zur Ermittlung dieser Werte finden Sie auf Seite 2
- Die IST- und SOLL-Werte werden dann über das Online-Formular eingegeben und übermittelt.

Zeitpunkt der Erfassung (MM/JJ): _____

Werden Kitteltaschenflaschen verwendet? Ja Nein

In dieser Spalte die jeweilige <u>Raumbezeichnung</u> angeben → Sprech- / Behandlungszimmer in der Praxis, oder → Zimmer mit Dialyseplätzen, oder → Rettungswagen	Anzahl der vorhandenen Spender in diesem Raum IST-Wert	Anzahl der erforderlichen Spender in diesem Raum SOLL-Wert
	Gesamtzahl Spender	Gesamtzahl Spender

Verbrauch an Händedesinfektionsmittel und Zahl der Behandlungsfälle / Einsatztage für das Kalenderjahr _____

	Liter
	Behandlungsfälle /Einsatztage



Anleitung zur Ermittlung der Spenderausstattung

Definition Sprech- / Behandlungszimmer: alle Räume, in denen Maßnahmen **direkt** am Patienten durchgeführt werden, wie z.B. Untersuchungsraum und Labor.

- Die Spenderausstattung im OP-Bereich wird nicht erfasst.
- Eine Erfassung der Spenderzahl ist in der Ambulanten Hauskrankenpflege nicht möglich, es wird im Online-Formular nur gefragt, ob Sie Ihren Mitarbeiter-/innen Händedesinfektionsmittel zur Verfügung stellen

Ermittlung des IST-Wertes:

- Es werden ausschließlich nur die Spender erfasst, die sich tatsächlich **im** Sprech- / Behandlungszimmer bzw. am Behandlungsplatz befinden
- Folgende Spender werden gewertet:
 - Fest montierte Spender: z.B. Wandspender
 - Mobile Spender: z.B. Pumpflaschen auf Arbeitsflächen
 - Kitteltaschenflaschen
- Folgende Spender werden nicht gezählt:
 - Spender auf dem Flur, im Bad, bzw. außerhalb des Sprech- / Behandlungszimmers

Ermittlung des SOLL-Wertes

- **Behandlungszimmer**: 1 Spender pro Sprech- / Behandlungszimmer
- **Dialysebereich**: 1 Spender pro Dialyseplatz
- **Behandlungsplatz** (z.B. Rettungswagen): 1 Spender pro Behandlungsplatz

Anleitung Ermittlung Händedesinfektionsmittelverbrauch

Für den Verbrauch an Händedesinfektionsmittel wird die eingekaufte Menge Händedesinfektionsmittel des vergangenen Kalenderjahres zugrunde gelegt. Erfragen Sie diese bei Ihrem Fachhändler oder Apotheker. Verwenden Sie unterschiedliche Händedesinfektionsmittel, bilden Sie die Summe.

Als Nenner werden die Behandlungsfälle pro Kalenderjahr erfasst. Diese sind Abrechnungs-relevant und lassen sich in niedergelassenen Arztpraxen am einfachsten über das Praxis-Verwaltungs-Systeme feststellen.

- Rettungsdienst / Krankentransporte = Anzahl der Einsätze
- Niedergelassene Praxen = Behandlungsfälle
- Ambulante Dialyse = Anzahl Dialysen
- Ambulante Hauskrankenpflege = Anzahl Einsatztage